


Patientenkarte

Diese Patientenkarte erfüllt die Bedingungen der Zulassung und wurde von der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), genehmigt.

OPDUALAG® Patientenkarte, lokale Version 2.0
Genehmigt (BASG/AGES): August 2026
Genehmigungsnummer: 1425-AT-2600003



▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.

Information für Patienten und Patientinnen

Tragen Sie diese Karte bitte immer bei sich und informieren Sie Ihr behandelndes medizinische Fachpersonal (z.B. Ärzte und Ärztinnen, Apotheker und Apothekerinnen, sowie Notaufnahmepersonal), dass Sie eine Therapie mit Nivolumab/Relatlimab erhalten.



WICHTIG

Nivolumab/Relatlimab kann schwere Nebenwirkungen, die im Zusammen hang mit dem Immunsystem stehen, verursachen. Diese können verschiedene Teile Ihres Körpers betreffen. Die Nebenwirkungen können jederzeit während der Behandlung oder verzögert auch Wochen bis Monate nach der letzten Verabreichung auftreten. Manche der folgenden Nebenwirkungen können lebensbedrohlich sein und müssen sofort behandelt werden:

Körperteil	Mögliche Nebenwirkungen
Lunge	Neuer oder sich verschlechternder Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden oder Schmerzen im Brustkorb.
Bauch (Magen und Darm)	Durchfall (wässriger, dünner oder weicher Stuhl) oder häufigerer Stuhlgang als gewöhnlich; schwarzer, teerartiger oder klebriger Stuhl oder Blut oder Schleim im Stuhl; Schmerzen oder Druckempfindlichkeit im Magenbereich (Bauch).
Leber	Gelbfärbung der Haut oder des Augenweißes (Gelbsucht), Übelkeit oder Erbrechen, Schmerzen in der rechten Bauchseite, dunkler Urin, Müdigkeit, Blutungen oder Blutergüsse, die leichter als gewöhnlich auftreten.
Hormon-produ-zierende Drüsen (Diabetes und diabetische Ketoazi-dose)	Kopfschmerzen, vermehrtes Schwitzen, Gewichtszunahme oder -abnahme, verstärkte Müdigkeit, gesteigerter Hunger oder Durst, Bedürfnis zum häufigeren Wasserlassen, Haarausfall, Kältegefühl, Verstopfung, Veränderungen der Stimme, Schwindel oder Bewusstlosigkeit, Veränderungen der Stimmung oder des Verhaltens, Lichtempfindlichkeit, Probleme mit den Augen, schneller Herzschlag, Schwierigkeiten, klar zu denken, süß oder fruchtig riechender Atem, ein süßer oder metallischer Geschmack im Mund, ein veränderter Geruch von Urin oder Schweiß, Übelkeit oder Erbrechen, Bauchschmerzen, und tiefe oder schnelle Atmung.
Nieren	Verminderte Urinausscheidung, Schwellung der Knöchel, Appetitlosigkeit, Blut im Urin.
Haut	Ausschlag, Juckreiz, Blasenbildung und/oder Abschälen der Haut (möglicherweise tödlich), schmerzhafte wunde Stellen oder Geschwüre im Mund.
Herz	Neuer oder sich verschlechternder Schmerz im Brustkorb, unregelmäßiger und/oder schneller Herzschlag, Fatigue, Schwellung der Knöchel, Kurzatmigkeit.
Allgemein/ Andere	Verwirrtheit, Schläfrigkeit, Gedächtnisprobleme, Nackensteifheit, Gleichgewichtsprobleme, Prickeln oder Taubheit der Arme oder Beine, Doppelsehen, Augenschmerzen, Veränderungen des Sehvermögens, anhaltende oder starke Muskelschmerzen oder schwäche, Muskelkrämpfe, geschwollene Lymphknoten.



Wenn bei Ihnen eines der oben genannten Anzeichen oder Symptome auftritt oder wenn Symptome anhalten oder sich verschlechtern, informieren Sie entweder **sofort** Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.



Immunvermittelte Nebenwirkungen können auch in anderen Organen oder Geweben auftreten. Diese Patientenkarte beschreibt nicht alle Anzeichen und Symptome von Nebenwirkungen der Behandlung mit Nivolumab/Relatlimab. Wenn Sie Nebenwirkungen entwickeln, auch solche, die nicht in dieser Karte oder der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, informieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, Apotheker/Apothekerin, oder medizinisches Fachpersonal.



WEITERE INFORMATIONEN

- Informieren Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin über Vor- oder Begleiterkrankungen oder frühere/aktuelle Behandlungen. Geben Sie auch an, ob bei Ihnen eine Stammzelltransplantation mit Verwendung von Stammzellen eines Spenders (allogen) erfolgt oder geplant ist oder ob Sie eine Organtransplantation hatten.
- Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Nebenwirkungen ist wichtig, um die sichere Anwendung von Nivolumab/Relatlimab zu gewährleisten. Anzeichen und Symptome können sich unbehandelt schnell verschlechtern, auch wenn sie leicht erscheinen.
- Versuchen Sie **NICHT**, die Symptome selbst zu behandeln. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin oder Ihr medizinisches Fachpersonal um Rat fragen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen haben, benötigen Sie möglicherweise andere Arzneimittel, um Ihre Symptome zu reduzieren oder eine Verschlechterung zu verhindern. Es kann auch sein, dass Ihr Arzt/Ihre Ärztin die Behandlung mit Nivolumab/Relatlimab verschieben oder ganz beenden muss, wenn Sie schwere Nebenwirkungen entwickeln.
- Weitere Informationen können Sie in der Opdualag Packungsbeilage nachlesen (verfügbar auf der Internetseite <https://www.bms.com/at>) oder wenden Sie sich an Bristol Myers Squibb Medical Information unter der Telefonnummer: +43 1 601 43 220, E-Mail: medinfo.austria@bms.com.



Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5, A-1200 WIEN
Fax: + 43 50 555 36207
Website: <https://nebenwirkung.basg.gv.at/>

oder an das Unternehmen:
E-Mail: medinfo.austria@bms.com
Telefon: +43 1 601 43 220

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.



WICHTIGE Information für medizinisches Fachpersonal

- Dieser Patient/diese Patientin wird mit Nivolumab/Relatlimab behandelt, das schwere immunvermittelte Nebenwirkungen verursachen kann, die verschiedene Organsysteme betreffen und zum Tod führen können.
- Immunvermittelte Nebenwirkungen können jederzeit während oder verzögert Wochen bis Monate nach Ende der Behandlung auftreten.
- Das frühe Erkennen und die richtige Behandlung der immunvermittelten Nebenwirkungen sind essenziell, um das Risiko lebensbedrohlicher Komplikationen zu minimieren.
- Die Konsultation eines Onkologen/einer Onkologin oder eines anderen Facharztes/einer anderen Fachärztin kann für das Management organspezifischer immunvermittelter Nebenwirkungen hilfreich sein.
- Medizinisches Fachpersonal sollte sich auf die Opdualag Fachinformation beziehen (verfügbar auf der Internetseite <https://www.bms.com/at>) oder wenden Sie sich an Bristol Myers Squibb Medical Information unter der Telefonnummer: +43 1 601 43 220, E-Mail: medinfo.austria@bms.com.

Kontakt Daten des Arztes/der Ärztin (der/die Nivolumab/Relatlimab verschrieben hat)

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Name des Arztes/der Ärztin _____

Telefonnummer während der Sprechzeiten: _____

Telefonnummer außerhalb der Sprechzeiten: _____

Meine Kontaktdaten

Mein Name: _____

Meine Telefonnummer: _____

Notfallkontakt:

Name: _____ Telefonnummer: _____