



Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Meer informatie

ipilimumab

Patiëntenkaart

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Houd deze kaart altijd bij u. U moet deze laten zien aan dokters, apothekers en verpleegkundigen. Zij weten dan dat u ipilimumab krijgt.

Krijgt u één van de bijwerkingen die hieronder staan?
Vertel dat dan meteen aan de dokter die u behandelt.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

MAAG EN DARMEN

- diarree (waterige, dunne of zachte poep)
- bloed in uw poep of donkere poep
- u moet vaker naar de wc dan normaal
- pijn of een gevoelige maag of buik
- misselijkheid
- overgeven

OGEN

- rode ogen
- pijnlijke ogen
- wazig zien of andere problemen met zien

HORMOONKLIEREN

- gewichtstoename of -verlies
- vermoeidheid
- hoofdpijn
- duizeligheid of flauwvallen
- meer honger of dorst hebben dan normaal
- vaker moeten plassen
- gedragsveranderingen (bijv. minder zin in seks, prikkelbaar of vergeetachtig zijn)

LEVER

- geel oogwit of gele huid ('geelzucht')
- pijn aan de rechterbovenkant van uw buik
- donkergekleurde plas
- bloedingen

LONGEN

- kortademigheid
- hoesten
- pijn op de borst

ZENUWSTELSEL

- zwakke spieren
- geen gevoel of een tintelend gevoel in uw benen, armen of gezicht
- moeilijk wakker worden

HUD

- huiduitslag met of zonder jeuk
- droge huid
- blaren en/of schilferende huid
- pijnlijke zweertjes in de mond
- swelling in het gezicht of van de lymfeklieren

ANDERE BELANGRIJKE BIJWERKINGEN

Ernstige infusiereacties:

- Er kunnen reacties ontstaan door het toedienen van ipilimumab in het bloed. Als dit gebeurt, is dat meestal binnen 24 uur na toediening van ipilimumab.
- Vertel het uw arts of verpleegkundige meteen als u deze klachten krijgt tijdens de toediening van ipilimumab: koude rillingen of trillen; jeuk of huiduitslag; blozen; moeite met ademhaling; duizeligheid; koorts; en het gevoel hebben dat u flauwvalt.

BELANGRIJK

- Vertel uw dokter over ziektes die u vroeger heeft gehad.
- Het is belangrijk dat een bijwerking snel wordt herkend en wordt behandeld door een dokter. Hierdoor is de kans kleiner dat uw behandeling met ipilimumab tijdelijk of helemaal gestopt moet worden.
- Als bijwerkingen die mild lijken niet behandeld worden, kunnen ze snel erger worden.
- Probeer niet zelf iets aan de bijwerkingen te doen.
- Het kan zo zijn dat u pas later bijwerkingen krijgt. Bijvoorbeeld pas weken of maanden na de laatste keer dat u ipilimumab hebt gekregen.

Contactgegevens van uw behandelend arts

Naam van uw dokter

.....
.....

Telefoonnummer tijdens werktijden

.....
.....

Telefoonnummer buiten werktijden

.....
.....

Contactgegevens van de patiënt

Uw naam

.....
.....

Uw telefoonnummer

.....
.....

Wie moet er gebeld worden als u in nood bent (ICE)

.....

BELANGRIJKE informatie voor zorgverleners

- Deze patiënt wordt behandeld met **ipilimumab** monotherapie.
- Immuungerelateerde bijwerkingen (irAR's) en ernstige infusiereacties kunnen op ieder moment tijdens de behandeling optreden of maanden na beëindigen van de behandeling.
- Vroege diagnose en adequate behandeling van de bijwerkingen zijn essentieel om levensbedreigende complicaties te minimaliseren
- Het kan nuttig zijn om een oncoloog of andere medische specialist te consulteren om orgaanspecifieke immuungerelateerde bijwerkingen te behandelen.
- Medische zorgverleners dienen op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) van ipilimumab te raadplegen of de afdeling Medische Informatie te bellen via: **030 - 3002 222**.

De zorgverlener die deze patiënt behandelt met ipilimumab, dient de sectie "Contactgegevens van uw behandelend arts" op deze waarschuwingskaart in te vullen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.