

## Meer informatie

Wilt u meer informatie over uw medicijn?  
Lees de bijsluiter of scan de QR-code  
voor het online materiaal.

Ga met vragen over uw medicijn of  
bijwerkingen naar uw arts of apotheker.



Datum van CBG-goedkeuring: 27 juni 2025  
Document versienummer: IMM-NL-2500003

# ZEPOSIA (ozanimod)

---

## Patiëntkaart

Informatie voor vrouwen die zwanger kunnen worden

# Informatie voor de patiënt

Wanneer ozanimod tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, kan dit schadelijk zijn voor de ongeboren baby. Risico's zijn onder meer het verlies van de ongeboren baby en geboortefwijkingen.

- Ozanimod mag niet worden gebruikt als u zwanger bent of borstvoeding geeft, of als u zwanger kunt worden en geen effectieve anticonceptie gebruikt.
- Voordat u met de behandeling met ozanimod begint zal uw arts u uitleg geven over de risico's voor een ongeboren baby als u zwanger wordt terwijl u ozanimod gebruikt en over de maatregelen die u moet nemen:
  1. U moet effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met ozanimod, ook wanneer de behandeling wordt onderbroken, en gedurende 3 maanden nadat u met ozanimod bent gestopt.

2. U moet een negatieve zwangerschapstest aan uw arts voorleggen om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent. De test moet met gepaste tussenpozen worden herhaald.

- Als u tijdens de behandeling zwanger wordt, moet ozanimod worden gestopt.
- Vertel uw arts als u zwanger bent, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of van plan bent om zwanger te worden terwijl u ozanimod gebruikt en gedurende 3 maanden nadat u bent gestopt met het gebruik van ozanimod. Uw arts zal u informeren over de mogelijk schadelijke effecten van ozanimod op de baby. Ook zullen er echo's worden uitgevoerd.
- U moet 3 maanden voor u van plan bent zwanger te worden stoppen met ozanimod.
- Als u stopt met ozanimod, laat uw arts weten als de symptomen van uw ziekte verergeren, aangezien de kans bestaat dat uw ziekte weer actief wordt.